

bres y 8 mujeres. En 17 de los 18 casos incidentes consta un país de origen distinto de España: Brasil (10), Bolivia (2), Paraguay (3), India (1), Gambia (1) y uno no consta.

Durante el año 2009 se notificaron al registro estatal 25 casos de lepra (datos provisionales a 31/12/2009), de los cuales 22 eran incidentes, 2 trasladados y 1 recidiva. El número de casos prevalentes en esa fecha era de 82. En 18 de los 22 casos incidentes constaba un país de origen distinto de España. Estos datos provisionales se enviaron a las Comunidades Autónomas en un informe semanal de difusión interna, y cuando estén actualizados se publicarán en un número posterior del boletín.

Como todos los años hay que seguir insistiendo en la importancia de vigilar el estricto cumplimiento del tratamiento para conseguir la curación de cada enfermo y con ello la disminución de la prevalencia en nuestro país. También es necesario que los dermatólogos tengan presente esta enfermedad poco común, especialmente en los diagnósticos de pacientes procedentes de países endémicos de lepra.

Tabla 3

Incidencia de lepra por grupos de edad y sexo. Registro Estatal de Lepra. España. Datos provisionales a 21/01/2010

GRUPOS DE EDAD	MASCULINO	FEMENINO	TOTAL
0 – 14	0	0	0
15 – 24	(1*) 1	(1*) 1	(2*) 2
25 – 44	(7*) 7	(6*) 6	(13*) 13
45 – 64	1	(1*) 1	(1*) 2
65 y más	(1*) 1	0	(1*) 1
Total Estatal	(9*) 10	(8*) 8	(17*) 18

* Número de casos de personas inmigrantes con residencia actual en España.

Bibliografía

1. Heymann, DL. Control of Communicable Diseases Manual, 19th Ed: APHA, 2008.
2. World Health Organization. Global leprosy situation, 2009. Weekly epidemiological record No. 33, 2009, 84, 333-340.
3. O. Díaz, E. Rodríguez, G. Hernández. Vigilancia de la lepra en España, 2007. Bol Epidemiol Semanal 2007; 15(20): 229-240.

CLASIFICACIÓN DE LOS CASOS SOSPECHOSOS DE SARAMPIÓN Casos acumulados desde 01/01/2009 hasta 03/01/2010 (semana 52 actualizada 11/01/2010)

CC.AA.	Casos notificados (1)	En Investigación	Casos Confirmados				Casos descartados (5)			
	Total	Total	Compatibles (2)	Autóctonos Laboratorio (3)	Importados Laboratorio (4)	Total	Rubéola	Otros Diagnósticos (6)	Sin Diagnosticar	Total
Andalucía.....	40	–	5	18	–	23	1	–	16	17
Aragón.....	1	–	–	–	–	–	–	–	1	1
Asturias.....	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Baleares.....	3	–	–	–	1	1	–	1	1	2
Canarias.....	5	–	–	–	–	–	–	2	3	5
Cantabria.....	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Castilla-La Mancha.....	6	–	2	2	–	4	–	–	2	2
Castilla y León.....	1	–	–	–	–	–	–	–	1	1
Cataluña.....	21	1	–	7	4	11	–	1	8	9
Comunidad Valenciana.....	4	–	–	–	–	–	–	–	4	4
Extremadura.....	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Galicia.....	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Madrid.....	2	1	–	–	1	1	–	–	–	–
Murcia.....	1	–	–	–	–	–	–	–	1	1
Navarra.....	1	–	–	–	–	–	–	–	1	1
País Vasco.....	4	–	–	–	–	–	–	1	3	4
Rioja.....	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ceuta.....	2	–	–	–	–	–	–	–	2	2
Melilla.....	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TOTAL.....	91	2	7	27	6	40	1	5	43	49

- (1) **Caso notificado sospechoso:** Todo caso que cursa con exantema máculo-papular, fiebre alta y alguno de los siguientes síntomas: tos, coriza o conjuntivitis.
 (2) **Caso confirmado compatible:** Caso notificado sin muestras biológicas para diagnóstico y sin vínculo epidemiológico con otro caso confirmado por laboratorio.
 (3) **Caso confirmado por laboratorio:** Caso notificado confirmado por laboratorio o caso vinculado en espacio y tiempo con un caso confirmado por laboratorio.
 (4) **Caso confirmado importado:** Caso notificado confirmado por laboratorio con fuente de infección fuera de España.
 (5) **Caso descartado:** Caso notificado con muestras de laboratorio negativas al virus del sarampión.
 (6) **Otros diagnósticos:** Identificación de otros virus diferentes de Rubéola: enterovirus, Posible reacción alérgica, Sífilis cutánea granulomatosa.
 Más información (BES 2000;8:169-172)