

tomáticos y/o subclínicos que justificaría esta alteración de la secuencia³, refuerza la hipótesis de que el adecuado estado vacunal limita la circulación de las variantes virales de genotipo G1 detectadas⁵.

Bibliografía

1. Sartorius, B., et al. An outbreak of mumps in Sweden, February-April 2004. *Eurosurveillance*, vol. 10: 191-193. Jul-Sept 2005.
2. Savage, E., et al. Mumps outbreak across England and Wales in 2004: observational study. *BMJ* 2005; 330: 119- 120.
3. Ravindra, K., et al. Mumps and the UK epidemic 2005. *BMJ* 2005; 330: 1132-1135.
4. Jin, L., et al. Genetic diversity of mumps virus in oral fluid specimens: Application to mumps epidemiological study. *JID* 2004; 189: 1001-1008.
5. Örvell, C.; et al. Antigenic relationship between six genotypes of the small hydrophobic protein gene of mumps virus. *Journal of General Virology*. 2002. 83: 2489-2496.

| CC.AA. | Casos notificados (1) | En Investigación | Casos Confirmados | | | | Casos descartados (5) | | | |
|-------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|-----------|-----------------------|------------------------|------------------|----------|
| | Total | Total | Compatibles (2) | Autóctonos Laboratorio (3) | Importados Laboratorio (4) | Total | Rubéola | Otros Diagnósticos (6) | Sin Diagnosticar | Total |
| Andalucía..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aragón..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Asturias..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Baleares..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Canarias..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cantabria..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Castilla-La Mancha..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Castilla y León..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cataluña..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Comunidad Valenciana | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Extremadura..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Galicia..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Madrid..... | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Murcia..... | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Navarra..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| País Vasco..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rioja..... | 22 | 2 | - | 17 | - | 17 | - | - | 3 | 3 |
| Ceuta..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Melilla..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL..... | 25 | 3 | - | 17 | - | 17 | - | - | 5 | 5 |

(1) Caso notificado sospechoso: Todo caso que cursa con exantema máculo-papular, fiebre alta y alguno de los siguientes síntomas: tos, coriza o conjuntivitis.

(2) Caso confirmado compatible: Caso notificado sin muestras biológicas para diagnóstico y sin vínculo epidemiológico con otro caso confirmado por laboratorio.

(3) Caso confirmado por laboratorio: Caso notificado confirmado por laboratorio o caso vinculado en espacio y tiempo con un caso confirmado por laboratorio.

(4) Caso confirmado importado: Caso notificado confirmado por laboratorio con fuente de infección fuera de España.

(5) Caso descartado: Caso notificado con muestras de laboratorio negativas al virus del sarampión.

(6) Otros diagnósticos: Identificación de otros virus diferentes de Rubéola.

Más información (BES 2000;8:169-172).